



Sandoz Produktguide

Oktober 2003 - 21 produkter



Sandoz produktguide:

Nya aktuella produktguider kommer kontinuerligt att finnas dig tillhanda.

För övriga indikationer och doseringar än de i produktguiden se www.fass.se.

Färgmarkeringar:

ALLERGI

CNS

DIABETES

HJÄRTA / KÄRL

INFEKTION

MAGE / TARM

SMÄRTA

Sandoz och våra förpackningar

Sandoz har före 20 oktober 2003 gått under namnet Biochemie. Sandoz och Biochemies förpackningar kommer båda att finnas på marknaden under en övergångsperiod.

För mer information ring 08-732 33 08 eller besök oss på www.sandoz.se.

Olika färgfält för olika styrkor minskar risken för förväxling:

Tydliga förpackningar underlättar för både apotekspersonal, sjuksköterskor och patienter. Sandoz förpackningar med färgmarkeringar gör det lätt att hitta rätt produkt. En färg markerar produkten och en annan läkemedlets styrka. På så sätt är risken för förväxling minimal.





Förpackningar:

– Tabl. 10 mg 7, 14, 30 (receptfritt), 30, 100 och 100x1 st (endos)

Cetirizin Sandoz

Synonymt med Zyrlex®

R06A E07 Antihistamin H1-antagonist

Indikationer:

Symtomatisk behandling av allergisk rinit (säsongsbunden och perenn), associerad allergisk konjunktivit och kronisk idiopatisk urtikaria. Associerad allergisk konjunktivit är inte indicerad för barn under 12 år.

Dosering:

Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett eller 10 ml lösning en gång dagligen. Om trötthet uppkommer kan dosen tas på kvällen.

Barn 6-12 år (tabletter): 1 tablett dagligen eller 1/2 tablett morgon och kväll. Barn som väger mindre än 30 kg: 1/2 tablett eller 5 ml lösning en gång dagligen.

Dosering vid nedsatt lever och njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

- Tabl. 10 mg 30, 100x1 (endos) och 250 st (burk)
- Tabl. 20 mg 30, 100x1 (endos) 250 och 500 st (burk)
- Tabl. 40 mg 30, 100x1 st (endos)

Samtliga burkar är för dosdispensering

Citalopram Sandoz

Synonymt med Cipramil®

N06A B04 Antidepressivum selektiv serotoninåterupptagshämmare

Indikationer:

Behandling av egentlig depression.

Dosering:

Tabletten tas med vätska en gång dagligen, antingen på morgonen eller kvällen. Rekommenderad startdos är 20 mg dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 40 mg dagligen. Maximal dos är 60 mg dagligen. Äldre patienter ges halverad normaldos.

Dosering vid nedsatt lever- och njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

– Kaps. 20 mg 30 och 100x1 st (endos)

Fluoxetin Sandoz

Synonymt med Fontex®

NO6A B03 Antidepressivum selektiv serotoninåterupptagshämmare

Indikationer:

Egentliga depressioner.

Dosering:

20 mg dagligen och den maximala dosen skall ej överstiga 80 mg dagligen. Doser över 20 mg dagligen skall endast ges när det är kliniskt berättigat. Terapeutisk effekt ses först efter 3–4 veckors behandling. Fluoxetin kan ges som engångsdos eller fördelat på flera doser (vid dosering överstigande 20 mg dagligen) i samband med måltider eller mellan måltiderna. Kapslarna bör sväljas hela tillsammans med tillräcklig mängd vatten (ca 1,5 dl) för att undvika esofagit. Vid nedsatt njur- och/eller leverfunktion (GFR 10–50 ml/min) skall doseringen minska, t ex till 20 mg varannan dag. Äldre: Data angående effekt och säkerhet hos äldre är otillräckliga. Behandlingen påbörjas med 10 mg dagligen och titreras därefter till en effektiv dygnsdos på 20–40 mg dagligen. Försiktighet tillråds vid ökning av dosen, som normalt inte bör överstiga 40 mg och aldrig över 60 mg.

För mer information se www.fass.se.



Förpackningar:

- Tabl. 500 mg 100 st
- Tabl. 850 mg 100 st

Metformin Sandoz

Synonymt med Glucophage®
A10B A02 Peroralt antidiabetikum

Indikationer:

Behandling av diabetes mellitus typ 2 hos vuxna, speciellt hos överviktiga där enbart diet och motion inte ger tillräcklig metabolisk kontroll. Metformin Sandoz kan användas som monoterapi eller i kombination med andra perorala diabetesmedel eller med insulin.

Dosering:

Monoterapi och kombination med andra orala antidiabetika: Vanlig startdos är 1 tablett 500–850 mg 2–3 gånger dagligen antingen i samband med eller efter måltid. Efter 10 till 15 dagar bör dosen justeras baserad på mätning av blodsocker. En långsam ökning av dosen kan ge förbättrad gastrointestinal tolerans. Rekommenderad maximal dos av metformin är 3 g dagligen. Vid övergång från ett annat oralt antidiabetika planeras: sluta behandlingen med det andra medlet och starta metformin med den dos som anges ovan.

Dosering för övriga indikationer och vid nedsatt njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

- Tabl. 25 mg 30 och 100x1 st (endos)
- Tabl. 50 mg 30 och 100x1 st (endos)
- Tabl. 100 mg 100x1 st (endos)

Atenolol Sandoz

Synonymt med Tenormin®

CO7A B03 Beta-receptorblockerare

Indikationer:

Hypertoni. Kronisk stabil angina pectoris. Sekundärprevention efter akut hjärtinfarkt. Supraventrikulära och ventrikulära arytmier.

Dosering:

Dosen anpassas individuellt. Behandlingen bör inledas med lägsta möjliga dosering så att hjärtsvikt, bradykardi och bronkiala symtom ses i tid. Detta är speciellt viktigt hos äldre. Ytterligare dosanpassning bör ske gradvis (t ex 1 gång per vecka) under kontrollerade former eller baserat på klinisk effekt.

Hypertoni: Rekommenderad initialdos 25 mg. Vanlig underhållsdos 1 tablett (50–100 mg) dagligen. Maximal effekt erhålls efter 1–2 veckor.

Om ytterligare förbättring av blodtrycket är önskvärd kan atenolol kombineras med ett annat blodtrycksänkande medel, t ex ett diuretikum. Hos äldre patienter skall behandlingen påbörjas med lägre dosering.

Dosering för övriga indikationer och vid nedsatt njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

- Tabl. 5 mg 30, 100, 100x1 (endos) och 250 st
 - Tabl. 10 mg 100, 100x1 (endos) och 250 st
- Samtliga 250 st burkar är för dosdispensering

Bisoprolol Sandoz

Synonymt med Emconcor®

C07AB07 Selektiv β_1 -receptorantagonist

Indikationer:

Hypertoni och kronisk stabil angina pectoris.

Dosering:

Dosen skall anpassas individuellt. Behandlingen bör inledas med en så låg dos som möjligt. Normaldos är 10 mg dagligen och den maximala rekommenderade dosen är 20 mg dagligen.

Nedsatt njurfunktion: För patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion, kreatininclearance <20 ml/min, skall dosen inte överstiga 10 mg dagligen.

Avbrytande av behandling: Dosen skall minskas långsamt genom att dosen halveras veckovis.

Dosering för äldre och personer med nedsatt njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

- Tabl. 12,5 mg 100 st
- Tabl. 25 mg 100x1 (endos), 100 och 200 st (burk)
- Tabl. 50 mg 100 och 200 st (burk)

Samtliga 200 burkar är för dosdispensering

Captopril Sandoz

Synonymt med Capoten®
CO9A A01 ACE-hämmare

Indikationer:

Hypertoni. Hjärtsvikt. Hjärtinfarkt med vänsterkammardysfunktion.
Diabetesnefropati.

Dosering:

Captopril Biochemie kan ges 1 eller 2 gånger dagligen. Maximal dygnsdos är 150 mg. Tabletten skall intas med vatten tillsammans med måltider eller mellan måltider. Initialdos vid essentiell hypertoni är 25–50 mg dagligen. Om tillräcklig effekt ej erhålls inom 2–3 veckor kan dosen ökas till 100 mg dagligen. Om effekten efter ytterligare 2–3 veckors behandling ej är tillfredsställande bör kombinationsbehandling med ett (icke-kaliumsparande) diuretikum påbörjas.

Dosering för övriga indikationer och vid nedsatt njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

- Tabl. 2,5 mg 30, 100x1 (endos) och 250 st (burk)
 - Tabl. 5 mg 30, 100x1 (endos) och 250 st (burk)
 - Tabl. 10 mg 30, 100, 100x1 (endos) och 250 st (burk)
 - Tabl. 20 mg 30, 100, 100x1 (endos) och 250 st (burk)
- Samtliga 250 burkar är för dosdispensering

Enalapril Sandoz

Synonymt med Renitec®
CO9A A02 ACE-hämmare

Indikationer:

Hypertoni. Behandling av hjärtsvikt som tilläggsterapi till diuretika och/eller digitalis. Prevention av hjärtsvikt hos patienter med ickesyntomgivande vänsterkammardysfunktion (vänster kammarens ejektionsfraktion <35%).

Dosering:

Hypertoni: Behandlingen startas med 5 mg per dag (2,5 mg i kombination med diuretikaterapi). Dosen skall titreras för att ge optimal kontroll av blodtrycket. Vanlig underhållsdos är 10–20 mg (givet 1 gång dagligen eller fördelat på flera doser), men doser upp till 40 mg dagligen eller 20 mg 2 gånger per dag kan användas.

Äldre patienter (över 65 år): En initialdos på 2,5 mg rekommenderas.

Enalapril är effektiv vid behandling av hypertoni hos äldre patienter. Dosen titreras efter terapisvaret för att kontrollera blodtrycket.

Dosering för övriga indikationer se www.fass.se.



Förpackningar:

– Tabl. 20mg/12,5mg 30 och 100x1 st (endos)

Enalapril Comp Sandoz

Synonymt med *Renitec® comp*
 C09B A02 ACE-hämmare och diuretika

Indikationer:

Essentiell hypertoni. Enalapril Comp Sandoz är en fast kombination och inte lämplig för att inleda behandling. Enalapril Comp Sandoz kan användas för att ersätta kombinationen 20 mg enalaprilmaleat och 12,5 mg hydroklortiazid hos patienter som stabiliserats på respektive komponent givna i samma dos.

Dosering:

Dosen bestäms i första hand av svaret på kombinationspreparatets enalaprilkomponent. Essentiell hypertoni: Vanlig dos är 1 tablett dagligen. Tidigare diuretikabehandling: Behandling med diuretika ska avslutas 2-3 dagar innan behandling med Enalapril Comp Sandoz inleds.

För övrig dosering samt barn och äldre se www.fass.se.



Förpackningar:

- Depottabl. 5 mg 30, 100x1 (endos), 250 st (burk)
- Depottabl. 10 mg 100x1 st (endos)

Samtliga 250 burkar är för dosdispensering

Felodipin Sandoz

Synonymt med Plendil®

C08C A02 Kalciumantagonist

Indikationer:

Essentiell hypertoni.

Dosering:

Rekommenderad initial dos är 5 mg felodipin en gång dagligen.

Vid behov kan dosen höjas till 10 mg felodipin en gång dagligen alternativt kan något annat blodtryckssänkande läkemedel adderas.

Dosökningar skall göras med intervaller på minst 2 veckor. Vanlig underhållsdos är 5-10 mg en gång dagligen på morgonen. Maximal dos är 10 mg felodipin dagligen. Dosen ska justeras efter patientens individuella behov.

Depottabletterna ska sväljas hela och får ej tuggas eller krossas.

Dosering för äldre och vid nedsatt lever- och njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

- Tabl. 10 mg 30, 100x1 (endos) och 250 st (burk)
- Tabl. 20 mg 30 och 100x1 (endos) och 250 st (burk)
- Tabl. 40 mg 100x1 och 250 st (burk)

Samtliga 250 burkar för dosdispensering.

Simvastatin Sandoz

Synonymt med Zocord®

C10AA01 Serumlipidsänkande medel

Indikationer:

Hyperkolesterolemi: För reduktion av förhöjt totalkolesterol och LDL-kolesterol i plasma hos patienter med hyperkolesterolemi (typ IIa) eller kombinerad hyperlipidemi (typ IIb).

Kranskärslsjukdom: För sekundärprevention av kranskärslsjukdom hos patienter med förhöjda kolesterolnivåer i plasma. Profylaktisk behandling är indicerad då den totala kolesterolkoncentrationen i serum är 5,5 mmol/l eller högre.

Dosering:

Kolesterolsänkande diet ska sättas in innan behandlingen inleds och bibehållas under hela behandlingstiden. Tabletterna kan antingen tas på fastande mage eller efter måltid.

Hyperkolesterolemi: Vanlig startdos är 10 mg/dygn given som engångsdos på kvällen. Maximal dygnsdos är 80 mg.

Kranskärslsjukdom och förhöjda kolesterolnivåer: Vanlig startdos är 20 mg/dygn given som en engångsdos på kvällen.

För dosering vid nedsatt njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar

- Mixt. 50 mg/ml 60 ml och 100 ml
- Tabl. 500 mg 20, 30 och 100x1 st (endos)
- Tabl. 875 mg 14, 20 och 100x1 st (endos)

Bioclavid

Synonymt med Spektramox®

J01C R02 betalaktamantibiotikum + betalaktamashämmare

Indikationer:

Behandling av bakterieinfektioner orsakade av amoxicillinresistenta bakterier vars resistens beror på betalaktamaser:

Akut sinusit, akut exacerbation av kronisk bronkit, lobär pneumoni.

Dosering:

Vuxna och barn över 12 år (>40 kg): 875 mg 2 ggr dagligen. Vuxna och barn (>30kg): 500 mg 3 ggr dagligen. Bioclavid forte mixtur är i första hand avsedd för barn. Barn: 20 mg/kg kroppsvikt och dygn med avseende på mängden amoxicillin, fördelat på tre doser. Kan höjas till 40 mg/kg kroppsvikt och dygn. Vid otitis media har 7 dagars behandling prövats med gott resultat.

Bioclavid administreras normalt ytterligare 3-4 dagar efter förbättring eller regression av symtom. Behandlingen ska inte överstiga 14 dagar utan utvärdering. Infektioner med β -hemolytiska streptokocker ska behandlas under minst 10 dagar för att undvika sena komplikationer.

Tabletterna ska sväljas hela.

Dosering vid nedsatt njurfunktion och för övriga indikationer se www.fass.se.



Förpackningar:

- Kaps. 500 mg 14, 20, 30 och 100x1 st (endos)
- Tabl. 1g 5, 7, 10, 100 och 100x1 st (endos)
- Mixt. 100 mg/ml 60 och 100 ml (persika/aprikossmak)

Cefadroxil Sandoz

Synonymt med Cefamox®

JO1D A09 Antibiotikum av cefalosporintyp

Indikationer:

Nedre okomplicerad urinvägsinfektion. Hud- och mjukdelsinfektioner. Faryngotonsillit samt samhällsförvärd pneumoni (där penicillin inte givit önskad effekt eller är olämpligt av andra skäl).

Dosering:

Vuxna och barn (>40 kg): Hud- och mjukdelsinfektioner, nedre okomplicerade urinvägsinfektioner samt faryngotonsillit och samhällsförvärd pneumoni: 1 g 1 gång dagligen alternativt 500 mg 2 gånger dagligen. Vid behov kan dosen höjas till 1 g 2 gånger dagligen. Tabletter och kapslar tas med minst ett halvt glas vatten och gärna tillsammans med föda.

Dosering för barn och personer med nedsatt njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

- Pulver till injektionsvätska, lösning 0,5 g 10x1 st
- Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1g 10x1 st
- Pulver till injektions-/infusionsvätska, 2g 10x1 st

Cefotaxim Sandoz

Synonymt med Claforan®

J01D A10 Antibiotikum av cefalosporintyp, betalaktamasstabil

Indikationer:

Bakteriell pneumoni. Allvarliga njurinfektioner och övre urinvägsinfektioner. Svåra hud- och mjukdelsinfektioner. Genitala infektioner orsakade av gonokocker. Intraabdominella infektioner (såsom peritonit). Akut bakteriell meningit. Allvarliga infektioner utgångna från lungor, urinvägar eller tarm.

Dosering:

Vuxna och barn över 12 år: normaldos är 2-6 gram dagligen uppdelat på flera doser. Infektioner orsakade av en känslig mikroorganism: 1 gram var 12:e timme. i.m el. i.v. Infektioner orsakade av flera känsliga eller måttligt känsliga mikroorganismer: 1-2 gram var 12:e timme. Allvarliga infektioner orsakade av oidentifierade mikroorganismer: 2-3 gram som en enkeldos var 6-8:e timme.

Dosering för ytterligare indikationer och barn se www.fass.se.



Förpackningar:

- Pulver till injektion, lösning 1g 10x1 st
- Pulver till injektion, lösning 2g 10x1 st

Ceftazidim Sandoz

Synonymt med Fortum®

J01D A11 Ceftazidimpentahydrat

Indikationer:

Nosokomial pneumoni. Luftvägsinfektioner hos patienter med cystisk fibros. Empirisk behandling av infektioner hos neutropena patienter. Akut meningit. Urinvägsinfektioner i de övre urinvägarna och allvarliga infektioner utgångna från urinvägarna.

Dosering:

Vuxna: Normalt 1-2 g var 12:e timme. Dosen kan ökas till 2 g var 8:e timme hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Vid meningit 2 g var 8:e timme. Vid urinvägsinfektioner 500 mg var 12:e timme. Barn: Över 2 månader: 30-100 mg/kg/dygn uppdelat på 2-3 doser. Maximal dygnsdos 6 g. Nyfödda eller barn under 2 månader: 25-60 mg/kg/dygn uppdelat på 2 doser.

Vid meningit 50 mg/kg var 12:e timme hos nyfödda och var 8:e timme hos barn äldre än 8 dagar. Hos nyfödda kan halveringstiden för ceftazidim vara 3-4 gånger den hos vuxna.

För nedsatt njurfunktion och äldre se www.fass.se.



Förpackningar:

250 mg 10 och 20 st

500 mg 10 och 20 st

750 mg 20 st

Ciprofloxacin Sandoz

Synonymt med Ciproxin®

J01M A02 Kemoterapeutikum av kinolontyt


Indikationer

Infektioner i andningsvägarna, akut okomplicerad cystit, komplicerade infektioner i urinvägarna, pyelonefrit, akut okomplicerad gonorré och prostatit. Allvarlig bakteriell enterit, allvarliga infektioner i hud, mjukdelar, skelett och leder. Allvarliga systemiska infektioner orsakade av gramnegativa bakterier t.ex. septikemi, peritonit, infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar. Akut pulmonell exacerbation av cystisk fibros hos barn och ungdomar (5-17 år) orsakad av *Pseudomonas aeruginosa*.

Dosering:

Infektioner i andningsvägarna 250-500 mg×2 i 7-14 dagar. Akut, okomplicerad cystit hos kvinnor. 100-250 mg ×2 i 3 dagar. Komplicerade urinvägs-infektioner samt pyelonefrit 250-500 mg ×2 i 7-14 dagar. Prostatit: 500 mg×2 upp till 28 dagar. Gonorré, akut okomplicerad 250-500 mg som engångsdos. Allvarlig bakteriell enterit 500 mg två gånger dagligen. Vanlig behandlingstid: 3-7 dagar. Infektioner i hud och mjukdelar 500 mg×2 i 5-10 dagar. Infektioner i skelett och leder 500 mg×2 i 4 till 6 veckor eller längre. Allvarliga systemiska infektioner 500-750 mg×2. Tabletterna ska sväljas med vätska.

Dosering vid nedsatt lever och njurfunktion se: www.fass.se.



Förpackningar:

– Tabl. 400 mg 6, 14, 20, 30 och 100x1 st (endos)

Norfloxacin Sandoz

Synonymt med Lexinor®

JO1M A06 Antibiotikum av fluorokinolontyp

Indikationer:

Övre och nedre, komplicerad eller okomplicerad, akut eller recidiverande, urinvägsinfektion (inklusive pyelonefrit). Urinvägsinfektioner i samband med urologiska operationer eller njursten.

Dosering:

Vuxna, okomplicerad akut cystit: 400 mg 2 gånger dagligen i 3 dagar. Urinvägsinfektion: 400 mg 2 gånger dagligen i 7-10 dagar. Komplicerad urinvägsinfektion: 400 mg 2 gånger dagligen i 2-3 veckor. Vid nedsatt njurfunktion (≤ 30 ml/min): 400 mg 1 gång dagligen. Tabletterna ska sväljas hela med vätska minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

För ytterligare information se www.fass.se.



Förpackningar:

- Brustabl. 150 mg 10, 30, (receptfritt) 30 och 90 st
- Brustabl. 300 mg 90 st

Ranitidin Sandoz, brustablett

Synonymt med Zantac® Brus

A02B A02 Syrahämmande medel – H2-antagoist

Indikationer:

Duodenalsår, benigna ventrikelsår, profylaktisk behandling av kroniskt recidiverande duodenalsår, refluxesofagit och Zollinger-Ellisons syndrom. Ranitidine Biochemie skall inte användas vid behandling av lindriga gastrointestinala besvär som t ex nervösa magbesvär.

Dosering:

Duodenalsår och benigna ventrikelsår: 300 mg på kvällen alternativt 150 mg morgon och kväll, under minst 4 veckor. Enstaka patienter kan fortsätta behandlingen i ytterligare 4 veckor med samma dosering.

Refluxesofagit: 300 mg på kvällen alternativt 150 mg 2 gånger dagligen. Vid behov kan dosen ökas till 300 mg 2 gånger dagligen under 8-12 veckor

Dosering för ytterligare indikationer, barn och vid nedsatt njurfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

– 150 mg 30 st (receptfri)

Ranitidin Sandoz

Synonymt med Zantac®

A02B A02 Syrahämmande medel - H2-antagonist

Indikationer:

Duodenalsår. Benigna ventrikelsår. Postoperativt ulcus. Zollinger-Ellisons syndrom. Gastroesofageal refluxsjukdom. Underhållsbehandling av utläkt esofagit. Profylax mot blödningar i samband med stressulcus hos allvarligt sjuka patienter. Profylax mot recidiverande magblödning.

Dosering:

Normaldoseringen är 150 mg morgon och kväll eller alternativt 300 mg på kvällen i fyra veckor. Vid behov ytterligare 4 veckors behandling.

Vid eradikering *Helicobacter pylori* rekommenderas 300 mg ranitidin med amoxicillin 750 mg tre gånger dagligen och metronidazol 500 mg tre gånger dagligen i två veckor. Behandlingen med ranitidin bör fortsätta under ytterligare två veckor.

För ytterligare doseringsinformaton se www.fass.se.



Förpackningar:

- Enterokaps. 10 mg 7, 14, (receptfri) 28 och 56x1 st (endos)
- Enterokaps. 20 mg 14, (receptfri) 28, 56x1 (endos), och 100 st (burk)
- Enterokaps. 40 mg 28 st

Omeprazol Sandoz

Synonymt med Losec® MUPS®

A02B C01 Syrahämmande medel – protonpumpshämmare

Indikationer:

Duodenalsår. Benigna ventrikelsår. Refluxesofagit. Profylaktisk behandling av refluxesofagit. Behandling och profylaktisk behandling av NSAID-relaterade ventrikelsår och duodenalsår. Symtomatisk behandling av gastroesofageal refluxsjukdom. I kombination med antibiotika för eradikering av *Helicobacter pylori* hos patienter med peptiska sår orsakade av *Helicobacter pylori*. Zollinger-Ellisons syndrom.

Dosering:

Kapslarna sväljes hela med ett glas vätska. Kornen i kapslarna får inte tuggas eller krossas. Duodenalsår: 20 mg en gång dagligen under 2-4 veckor. I enstaka fall 40 mg en gång dagligen. Benigna ventrikelsår: 20 mg en gång dagligen under 4-(6)-8 veckor. I enstaka fall 40 mg en gång dagligen. Refluxesofagit: 20 mg en gång dagligen under 4-8 veckor. I enstaka fall 40 mg en gång dagligen.

För dosering vid övriga indikationer och nedsatt leverfunktion se www.fass.se.



Förpackningar:

- Enterotabl. 25 mg 30 och 100 och 100x1 st (endos)
- Enterotabl. 50 mg 30 och 100x1 st (endos)

Diklofenak Sandoz

Synonymt med Voltaren®

MO1A B05 Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Indikationer:

Reumatoid artrit, juvenil reumatoid artrit, artroser inklusive spondylartroser. Periarthritis humeroscapularis. Smärtsamma postoperativa och posttraumatiska inflammationer och svullnad, t ex efter dental eller ortopedisk kirurgi. Dysmenorré utan organisk orsak. Sjukdomar med feber, speciellt som korttidsbehandling i samband med kemoterapi vid infektioner med inflammation. Feber i sig är inte en indikation.

Dosering:

Allmänt: Dygnsdosen bör fördelas på 2–3 doseringstillfällen. Tabletterna skall sväljas hela tillsammans med minst ett glas vätska (200 ml).
Tabletterna kan tas till måltid. Äldre: Äldre patienter skall behandlas med minsta möjliga effektiva dos.

Dosering för specifik indikation se www.fass.se.

Sandoz produktguide:

Nya aktuella produktguider kommer kontinuerligt att finnas dig tillhanda.

För övriga indikationer och doseringar än de i produktguiden se www.fass.se.

Sandoz:

Sandoz har före 20 oktober 2003 gått under namnet Biochemie. Sandoz och Biochemies förpackningar kommer båda att finnas på marknaden under en övergångsperiod.

För mer information ring 08-732 33 08 eller besök oss på www.sandoz.se.

Sandoz

Novartis Sverige AB

Box 1150

183 11 TÄBY

Telefon +46 (0) 8 732 33 08

Telefax +46 (0) 8 732 25 63

www.sandoz.se

a Novartis company